

2006

Tous âges réunis

La région connaît une surmortalité par suicide sexes réunis comparativement au Québec (26,2 contre 18,6 pour 100 000), et ce, tant pour le territoire de la Mauricie que celui du Centre-du-Québec (tableau 1). Bien que tous les DSS affichent un indice comparatif

de mortalité par suicide, sexes réunis, supérieur à un (ce qui indique une surmortalité), le phénomène ne s'observe de façon statistiquement significative que pour les districts du Haut-Saint-Maurice, du Centre-de-la-Mauricie, de Drummond et d'Arthabaska.

Tableau 1

Nombre annuel moyen de suicide, taux ajusté et indice comparatif de mortalité selon le sexe, districts sociosanitaires et réseaux locaux de services de la Mauricie et du Centre-du-Québec et Québec, 1999-2003

Territoire	HOMMES			FEMMES			TOTAL		
	Nombre annuel moyen	Taux ajusté	ICM	Nombre annuel moyen	Taux ajusté	ICM	Nombre annuel moyen	Taux ajusté	ICM
Québec	1 086	29,8		290	7,8		1 376	18,6	
RSS Mauricie Centre-du-Québec	103	43,0	1,44	23	9,7	1,24	126	26,2	1,40
TSS Mauricie	54	41,9	1,41	13	9,6	1,21	67	25,5	1,37
RLS DSS Haut-Saint-Maurice	5	59,2	2,01	2	22,1	3,03	7	41,4	2,22
RLS Vallée-de-la-Batiscan	6	46,9	1,59	1	4,3	0,62	7	25,1	1,39
<i>DSS Mékinac</i>	3	42,3	1,50	0	3,2	0,39	3	22,6	1,27
<i>DSS Des Chenaux</i>	3	52,5	1,68	0	6,1	0,86	4	28,2	1,52
RLS DSS Centre-de-la-Mauricie	15	47,3	1,61	3	7,6	0,97	18	26,8	1,47
RLS DSS Maskinongé	5	37,4	1,29	1	6,6	0,87	6	22,7	1,20
RLS Trois-Rivières	23	36,0	1,21	7	10,3	1,30	30	23,0	1,23
<i>DSS Trois-Rivières</i>	14	35,2	1,19	6	13,3	1,68	20	24,0	1,30
<i>DSS Cap-de-la-Madeleine</i>	9	37,4	1,26	1	5,0	0,63	10	21,0	1,12
TSS Centre-du-Québec	49	44,0	1,48	11	9,9	1,27	59	27,1	1,44
RLS Bécancour-Nicolet-Yamaska	9	40,0	1,34	1	7,5	0,86	10	23,7	1,24
<i>DSS Nicolet-Yamaska</i>	5	47,2	1,54	1	6,3	0,66	6	25,9	1,36
<i>DSS Bécancour</i>	3	31,6	1,11	1	9,2	1,10	4	20,8	1,11
RLS DSS Drummond	21	46,3	1,57	4	8,1	1,05	24	27,4	1,46
RLS Arthabaska-de-l'Érable	19	42,9	1,46	6	13,1	1,68	25	28,2	1,51
<i>DSS Arthabaska</i>	15	44,5	1,52	5	14,5	1,83	19	29,7	1,59
<i>DSS de l'Érable</i>	5	38,4	1,29	1	8,7	1,28	6	24,1	1,29

Source : MSSS, Fichier des décès, 1999 à 2003

Les nombres en gras indiquent une différence statistiquement significative p < 0,01

Les hommes connaissent une mortalité par suicide quatre fois plus importante que celle des femmes (43,0 contre 9,7 pour 100 000). De plus, on observe bien, chez ces derniers, la surmortalité par suicide notée pour la région. Surmortalité qui s'observe, de façon statistiquement significative, tant pour le territoire de la Mauricie que celui du Centre-du-

Québec, ainsi que pour les districts du Haut-Saint-Maurice, du Centre-de-la-Mauricie, de Drummond et d'Arthabaska.

Chez les femmes, l'écart de mortalité par suicide tous âges réunis de la région et du Québec n'est pas statistiquement significatif à un seuil de signification statistique de 0,01. Toutefois, avec un test moins

sévère ($p < 0,05$), la mortalité par suicide des femmes de la région apparaît, elle aussi, supérieure à celle de l'ensemble des Québécois. Chez les femmes, les résultats par DSS reposent sur des petits nombres et présentent d'importantes fluctuations non

statistiquement significatives, ce qui rend leur interprétation difficile.

Toutefois, les indices comparatifs présentés par les DSS de Trois-Rivières, d'Arthabaska et, tout particulièrement, celui du Haut-Saint-Maurice méritent d'être signalés.

Selon l'âge

• Les moins de 15 ans

Le phénomène du suicide chez les moins de 15 ans demeure rare (une dizaine de cas en cinq ans dans la

région) et exige une analyse prudente. Toutefois, les jeunes de moins de 15 ans (sexes réunis) de la région apparaissent présenter une surmortalité comparativement aux jeunes Québécois de cet âge (tableau 2).

Tableau 2 Nombre annuel moyen de décès par suicide, taux ajusté et indice comparatif de mortalité selon l'âge et le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1999 à 2003				
	Nombre annuel moyen	Taux ajusté		ICM
		Québec	Région	
Moins de 15 ans - sexes réunis	2	0,7	2,8	4,16
15-24 ans - hommes	16	31,1	47,9	1,55
15-24 ans - femmes	4	7,8	11,3	1,47
15-24 ans - sexes réunis	20	19,7	30,4	1,53
25-44 ans - hommes	42	40,5	61,0	1,50
25-44 ans - femmes	7	10,3	11,0	1,08
25-44 ans - sexes réunis	49	25,6	36,5	1,42
45-64 ans - hommes	35	37,9	53,1	1,40
45-64 ans - femmes	10	11,3	14,9	1,31
45-64 ans - sexes réunis	44	24,4	34,0	1,38
65 ans et plus - hommes	9	27,0	31,0	1,15
65 ans et plus - femmes	2	5,1	4,0	0,76
65 ans et plus - sexes réunis	11	14,0	14,9	1,07
Total - hommes	103	29,8	43,0	1,44
Total - femmes	23	7,8	9,7	1,24
Total - sexes réunis	126	18,6	26,2	1,40

Sources : MSSS, fichier des décès 1999 à 2003

Les nombres en gras indiquent une différence statistiquement significative $p < 0,01$

• Les 15-24 ans

La région présente une surmortalité par suicide chez les 15-24 ans (sexes réunis et chez les hommes). Ce problème est particulièrement marqué en Mauricie, tout notamment au DSS du Haut-Saint-Maurice où hommes et femmes contribuent à cette situation.

• Les 25-44 ans

Il s'agit du groupe d'âge où la mortalité par suicide est la plus élevée. De plus, la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec connaît chez les 25-44 ans une surmortalité par suicide (sexes réunis et hommes). Cette surmortalité se voit en Mauricie (sexes réunis et hommes) comme au Centre-du-Québec (sexes réunis et

hommes). Les hommes du district de Drummond apparaissent particulièrement concernés.

• Les 45-64 ans

La région présente, aussi, une surmortalité par suicide chez les 45-64 ans (sexes réunis et hommes). Cette surmortalité se voit tant en Mauricie qu'au Centre-du-Québec (sexes réunis et hommes dans les deux cas). Les districts du Centre-de-la-Mauricie et d'Arthabaska sont sensiblement touchés par ce problème.

• Les 65 ans et plus

On n'observe aucun écart significatif pour la région et les territoires avec le Québec. Le district Des Chenaux paraît, cependant, présenter une surmortalité, sexes réunis, statistiquement significative mais ce résultat

repose sur de très petits nombres et doit être interprété avec prudence.

Évolution depuis 1994-1998

Le Québec a connu une légère diminution du taux ajusté de mortalité par suicide de 1994-1998 à 1999-2003 (figure 1). Cette diminution s'est particulièrement fait sentir chez les jeunes hommes (figure 2). La région n'a pas connu en parallèle cette diminution. De plus, les hommes de 45-64 ans de la région ont vu leur taux

augmenter au cours de cette courte période et se démarquent, maintenant, des Québécois du même âge (figure 2). Les écarts entre la région et le Québec quant à la mortalité par suicide des hommes de moins de 65 ans se sont donc accrus entre 1994-1998 et 1999-2003.

Figure 1
Taux ajusté de mortalité par suicide selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 1994-1998 et 1999-2003





Figure 2
Taux ajusté de mortalité par suicide selon l'âge, hommes de la Mauricie – Centre-du-Québec et du Québec, 1994-1998 et 1999-2003



Faits saillants

- La région présente une surmortalité par suicide comparativement à l'ensemble du Québec de 1999 à 2003.
- Cette surmortalité se remarque essentiellement chez les hommes. Elle apparaît moins nette chez les femmes de la région (écart non significatif à $p < 0,01$).
- Chez les hommes, seuls les 65 ans et plus ne présentent pas une surmortalité régionale comparativement au Québec.
- Tous les DSS de la région présentent un indice comparatif de mortalité par suicide indiquant une surmortalité. Cette différence n'est statistiquement significative que pour les DSS du Haut-Saint-Maurice, du Centre-de-la-Mauricie, de Drummond et d'Arthabaska.
- La région n'a pas connu la diminution récente du taux de mortalité par suicide notée pour l'ensemble du Québec.

Yves Pepin

Agent de planification/programmation et recherche